



2024年ももうすぐ終わります。冬は、感染症が流行しやすい時期です。インフルエンザや感染性胃腸炎なども注意して、年末年始を元気にお過ごしください。

## 感染性胃腸炎にご注意ください

ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが原因で、吐き気や嘔吐、下痢、腹痛などの症状が見られ、発熱する場合もあります。

下痢や嘔吐がある場合は早めに病院で診てもらい、脱水症状にならないよう、こまめな水分補給を心がけましょう。また、吐物や便にはウイルスが含まれているので適切な処理をし、片付け後は、手洗い・うがいを行ってください。ノロウイルスやロタウイルスにアルコール消毒薬は効果がありません(塩素系漂白剤は効果があります)。消化器症状がある場合は、登園前に受診していただき、登園が可能か医師に確認をお願いします。保育園では保健所の指導により、感染拡大を防止するため、吐物で汚れた衣服はそのままお返ししています。



#### ・ 下痢やおう吐で保育園をお休みした方がいい時の目安

※子ども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」より

#### ~下痢の時~

- ・24時間以内に2回以上の形がない便がある
- 食事や水分をとると下痢がある
- ・下痢とともに、体温がいつもより高い
- ・朝、おしっこが出ない。機嫌が悪く元気がない
- ・顔色が悪くぐったりしている

#### ~おう吐の時~

- ・24時間以内に2回以上吐いた
- 水を飲んでも吐いてしまう
- ・1回でも吐いていて いつもより体温が高め 機嫌が悪く元気がない 顔色が悪くぐったりしている

## これってOK?

# 下痢のときの食事

下痢のときは、脱水状態にならないよう 水分補給が大切。また、胃腸に負担の少 ない食事をとりましょう。 水分補給は 子ども用のイオン 飲料や湯冷ましを こまめに飲ませて あげましょう。

## 年末年始の急病は?

年末年始は休診となる病院が多いで

- す。お子さまの急な発熱やけがに備え
- て、事前にかかりつけの病院や、近く

の救急病院の診療時間や休診日、帰省

先の救急病院の情報を確認して

おくと良いです。

### お勧め

避けたい物

#### リンゴのすりお3し

整腸作用があるので、すり おろしや搾り汁を。

#### おかゆ、おじや

整腸作用があるので、症 状が落ち着くまでは続けま しょう。

#### やわらかく煮た野菜スープ

消化がよくなり、水分補給 にもなります。

#### **坩燥**類

腸を刺激して下痢を悪化さ せるので避けましょう。

#### パン、バター、チーズなど

脂肪を多く含み、腸に負担 をかけるので NG です。

#### 生野菜・繊維の多い野菜

消化によくなく、下痢を悪化させるため避けましょう。

## 今月の行事

2日(月) すみれ組

3日(火) つぼみ組、赤ちゅうりっぷ組

さくら組

4日(水) たんぽぽ組

5日(木) 黄色ちゅうりっぷ組、ゆり組

16日(月) 内科健診

18日(水) すみれ組 視力検査

身体計測

## インフルエンザ登園停止期間早見表

下の表を参考に発症日からの日数を計算してみて下さい。

#### ※登園には、医師の登園許可証明が必要です。

|                     | 発症日                                     | 発症後    | 発症後  | 発症後            | 発症後    | 発症後    | 発症後    | (発症した後5日を経過) |        |      |
|---------------------|---|--------|--|----------------|--------|--------|--------|--------------|--------|------|
|                     | 0日目                                     | 1日目    | 2日目  | 3日目            | 4日目    | 5日目    | 6日目    | 7日目          | 8日目    | 9日目  |
| ここに日付を記入<br>しましょう → | 月日                                      | 月日     | 月日   | 月日             | 月日     | 月日     | 月 日    | 月 日          | 月 日    | 月日   |
| 発症後1日目に<br>解熱した場合   |   | 解熱     | 解熱後1日目   | 解熱後2日目         | 解熱後3日目 |        | 登園可能   |              |        |      |
| →発症後6日目から登園可能       | 登園停止                                    | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止           | 登園停止   | 登園停止   |        |              |        |      |
| 発症後2日目に<br>解熱した場合   | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |        | fine man and | 解熱後1日目         | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | 登園可能   |              |        |      |
| →発症後6日目から登園可能       | 登園停止                                    | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止           | 登園停止   | 登園停止   |        | 300          |        |      |
| 発症後3日目に<br>解熱した場合   |   | Ta Jan | Tau un   | 解熱             |        | 解熱後2日目 | 解熱後3日目 | 登園可能         |        |      |
| →発症後7日目から登園可能       | 登園停止                                    | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止           | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止   |              |        |      |
| 発症後4日目に<br>解熱した場合   |   |        |  | 2000           | 解熱     | 解熱後1日目 | 解熱後2日目 | 解熱後3日目       | 登園可能   |      |
| →発症後8日目から登園可能       | 登園停止                                    | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止           | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止         |        |      |
| 発症後5日目に<br>解熱した場合   | 20,00                                   |        |  | - Constitution |        | fi 解熱  | 解熱後1日目 | 解熱後2日目       | 解熱後3日目 | 登園可能 |
| →発症後9日目から登園可能       | 登園停止                                    | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止           | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止   | 登園停止         | 登園停止   |      |

### 登園停止期間:発症した日(急な発熱など)を0日とし翌日から5日間を経過し、かつ解熱した日を0日とし翌日から3日間を経過するまで

- 1. 発症とは、病院を受診した日ではなく、発熱などのインフルエンザ様症状が始まった日で、その日を0日と考えます。
- 2. 1日の中で**発熱と解熱が両方あった場合は発熱日**となります。 解熱:**37℃以下**とする。一日のうちどこで測っても37℃以下であること。
- 3. インフルエンザと診断を受けた時と解熱したと判断された時は、9~17時の間に保育園(看護師)に連絡を下さい。
- 4. 登園の可否についてわからないことがあれば、かかりつけ医または保育園(看護師)にお問い合わせ下さい。
- 5. 登園時、書類を確認させて頂き、日数や登園可能日にズレがあり、登園停止期間内の場合は再度自宅で様子をみて頂きます。 集団生活の場であることを考慮し、ご理解とご協力をお願いします。